

# Tasectan<sup>®</sup>

CZ

## Doporučené použití

Tasectan je zdravotnický prostředek užívaný k obnovení fyziologické funkce střevní stěny. Byl speciálně vyvinut pro dosažení kontroly a zmírnění příznaků doprovázejících průjem vyvolané různými příčinami, jako je napětí břišní stěny a časté vyprazdňování. Je účinný během 12 hodin.

Tanát želatiny, ze kterého je přípravek složen, není narušen činností žaludku a působí tak, že vytváří film, který chrání střevní sliznici, což snižuje frekvenci a dobu trvání epizod průjmu.

## Typ a obsah balení

Deset nebo dvacet sáčků obsahujících prášek pro použití u dětí.

Blistrové balení obsahující patnáct nebo osm tobolek pro použití u dospělých.

Na trhu nemusí být všechny formy přípravku a velikosti balení.

## Složení

**Prášek:** 250 mg tanátu želatiny (vepřového původu).

**Tobolky:** 500 mg tanátu želatiny (vepřového původu), kukuřičný škrob a magnesium stearát (rostlinného původu).

## Návod k použití

**Prášek:** obsah jednoho sáčku smíchejte s malým množstvím tekutiny, která není horká, jako například mléka, ovocné šťávy nebo vody a ihned vypijte. Můžete jej také přidat do jogurtu nebo jakéhokoli jiného jídla. Neužívejte prášek přímo bez smíchání.

**Tobolky:** Polkněte tobolku s tekutinou.

## Dávkování

**Děti do 3 let:** 1 sáček každých 6 hodin, dokud příznaky nevyjmizí.

**Děti od 3 do 14 let:** 1 až 2 sáčky každých 6 hodin, dokud příznaky nevyjmizí.

**Dospělí a děti starší 14 let:** 1–2 tobolky každých 4–6 hodin, dokud příznaky nevyjmizí.

## Upozornění

- Konzultace s lékařem není před užitím přípravku nezbytná. Je nicméně doporučena v případě závažných nebo přetrvávajících příznaků, nebo v případě pochybností o diagnóze.
- V případě průjmu u dětí mladších 3 let a u starších osob je konzultace s lékařem doporučena, zvláště pokud jsou přítomny další příznaky.
- Tento zdravotnický prostředek není určený k farmakologické léčbě. Pokud takovou léčbu doporučí lékař, lze přípravek podávat souběžně.
- Při léčbě průjmu je doporučen zvýšený příjem tekutin a vhodná dietní opatření.
- I když vedlejší účinky přípravku nejsou známy, nedoporučuje se přípravek užívat během těhotenství nebo kojení, pokud není lékařem doporučeno jinak.
- Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Nepoužívejte přípravek, pokud jsou blistry nebo sáčky otevřené nebo poškozené. Tento zdravotnický prostředek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování. Chraňte před mrazem.
- Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí.

## Kontraindikace

Tasectan nesmějí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na tanát želatiny nebo na jakoukoli jinou složku přípravku.



NOVENTURE, S.L.  
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta  
08029 Barcelona - Španělsko



0373

Rev.04: 01.09.2019