

TITANLAX™

Sáčky

Vhodné k léčbě chronické nebo akutní zácpy nebo zácpy související se syndromem dráždivého tračníku (IBS - Irritable Bowel Syndrome). Užitečné při nadměrné produkci gastrointestinálního plynu.

1. Popis, složení a účel použití

PEG + Psyllium + Simethicon změkčuje stolicí, podporuje regulaci střevních funkcí a peristaltiku střev pomocí kombinace osmotických a objemových účinků.

1.1. Mechanismus účinku

Díky své afinitě (schopnost látky slučovat se s jinými látkami) k vodě pomáhá makrogol 3350 absorbovat vodu přítomnou v průsvitu střeva, čímž zvyšuje objem stolice, takže stolice je měkčí a snadněji se vytlačuje, aniž by způsobovala křeče, bolesti břicha nebo nouzové stavy. Ve vodě rozpustná vláknina obsažená v Psylliu vytváří gel schopný hydratovat hmotu stolice. Psyllium tímto způsobem podporuje regulaci střevních funkcí a díky svému objemovému efektu restartuje peristaltiku, zkracuje dobu průchodu střevem a napomáhá vyprázdnění. Přítomnost simetikonu v přípravku je díky jeho protipěňivému účinku účinná při adsorpci gastrointestinálního plynu spojeného se zácpou.

1.2. Složení

Každý sáček obsahuje: makrogol 3350, Psyllium, simetikon

Pomocné látky: kyselina citronová, sukralóza, acesulfam draselný, aroma (pomeranč, světlé), oxid křemičitý, hydrogenuhličitan sodný, slunečnicový lecitin.

2. Balení

Jedna krabička obsahuje 20 sáčků po 9,15 g.

3. Dávkování a návod k použití

Děti od 6 do 12 let: 1 sáček denně

Dospělá a děti nad 12 let: 2 sáčky denně

Použití u dětí je vhodné konzultovat s lékařem.

Obsah sáčku dobře rozpustíte ve sklenici vody a ihned vypijte.

Vzhledem ke gelotvorné aktivitě Psyllia se doporučuje přípravek užívat mezi jídly a zapít dostatečným množstvím vody (nejméně plnou sklenici vody, pokud možno dvěma sklenicemi), aby nedošlo k nabotnění v krku, které může způsobit dušení.

U dospělých je doporučeno vypít alespoň 2 litry tekutin denně.

U dětí a dospívajících je doporučeno vypít alespoň 1-1,5 litru denně.

Pokud stav přetrvává i po užití přípravku, je vhodné poradit se s lékařem.

4. Kontraindikace

Neužívejte TITANLAX™ jestliže máte:

- střevní obstrukce nebo stenózu
- perforaci střev
- zánětlivé onemocnění střev (například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

Nejsou k dispozici žádné studie o použití přípravku během těhotenství a kojení, proto užívejte TITANLAX™ pouze po poradě se svým lékařem.

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutné upravovat dávkování.

Přípravek užívejte až do odeznění příznaků. V případě refrakterní nebo chronické zácpy může být nutné opakovaně užívat přípravek. Takováto zácpa může být způsobena léčivými přípravky, přípravky proti bolesti (opioidy), přípravky pro léčbu Parkinsonovy choroby (anticholinergika), nebo se může vyskytnout v případě onemocnění, jako je roztroušená skleróza nebo Parkinsonova choroba.

Neužívejte přípravek TITANLAX™ déle než 30 dnů. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

5. Možné nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování se nežádoucí účinky vyskytují jen zřídka. Mohou se objevit gastrointestinální poruchy, jako je průjem (zejména na začátku léčby), bolesti břicha, kručení v břiše a nevolnost. Vzácně se může objevit alergická reakce (vyrážka a kopřivka) na kteroukoliv složku tohoto přípravku.

Pokud jste zaznamenali intoleranci nebo jiné nežádoucí účinky, okamžitě přerušete léčbu a poraďte se se svým lékařem. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

6. Interakce s léčivými přípravky a doplňky stravy

Při současném užití přípravku TITANLAX™ s jinými léčivými přípravky může být ovlivněna jejich biologická dostupnost. Účinnost může nepříznivě ovlivnit zejména osmotická síla makrogolu a rychlejší průchod gastrointestinálním traktem.

Psyllium může zvýšit účinek antidiabetik, což může způsobit zvýšenou hypoglykemii.

Doporučuje se užívat léčivé přípravky nebo doplňky stravy minimálně 2 hodiny po nebo před užitím přípravku TITANLAX™. Před užitím přípravku se poraďte s lékařem v případě, že užíváte jiné léčivé přípravky (jako je například inzulin).

7. Uchovávání

Uchovávejte TITANLAX™ na suchém místě mimo dosah zdrojů tepla a světla: sáček otevřete těsně před použitím. Neužívejte přípravek, pokud jsou sáčky poškozené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

8. Upozornění a opatření

Přípravek není určen pro děti do 6 let. Použít u dětí je vhodné konzultovat s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek déle než 30 dnů. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.

Neužívejte, jestliže máte intoleranci na tento přípravek. Neužívejte přípravek, jestliže jste alergický na polyethylenglykol nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku. Každý sáček je na jedno použití a má být otevřen těsně před použitím. Simetikon může narušovat účinky některých činidel používaných v diagnostice, jako je guajakova guma.

9. Doba použitelnosti

Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje na přípravek v neporušeném obalu.

10. Likvidace

Přípravek po uplynutí doby použitelnosti zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Neznečišťujte přípravkem ani jeho obalem životní prostředí.

Datum poslední revize: 12.2021

SITT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Itálie

Titanlax is a trademark of Bausch Health Companies Inc. or its affiliates.

© 2022 Bausch Health Companies Inc. or its affiliates

